


CUPRASOL[®]



OXICLORURO DE COBRE

OXICLORURO DE COBRE 70% p/v (700 g/l)

[SC]

Suspensión
Concentrada

FUNGIDICA MULTISITIO - BACTERICIDA

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el N°: ES-00985
Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según FRAC:

GRUPO	M01	FUNGICIDA
-------	-----	-----------



Para aplicación foliar. Véanse recomendaciones de uso y dosificaciones.
Requisito indispensable: **AGITAR ANTES DE USAR**

CUPRASOL es una suspensión concentrada de cobre de acción fungicida y bactericida para uso profesional y no profesional, en usos al aire libre e invernadero.
(Ver pag siguiente).

Cultivo

Agente

OLIVO -----	Repilo / Tuberculosis
TOMATE -----	Mildiu
VID -----	Mildiu / Bacteriosis

COBRE
70



CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA

Producto fitosanitario utilizable
en producción vegetal ecológica
conforme a la norma
UNE 315500:2017 //
CERTIFICACIÓN - N° AN1211PE-01



Envases 5 L
Cajas 4x5 L



954 10 17 26



info@agrosolem.com



www.agrosolem.com



CUPRASOL®



USOS Y DOSIS AUTORIZADAS - ÁMBITO DE APLICACIÓN AGRARIO

Uso profesional: al aire libre. Aplicación en pulverización normal con tractor, manual con lanza, pistola o mochila:

USO	AGENTE	DOSIS	NºAP	INT	CALDO	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
OLIVO	REPILO	1,5 L/Ha	1-2	23 días	1000 L/Ha	Eficaz contra <i>Cyloconium oleaginum</i> . Aplicar en BBCH 00-04, BBCH 11-69 y BBCH 80-85.
	TUBERCULOSIS	1,5 L/Ha	1-2	23 días	1000 L/Ha	Eficaz contra <i>Pseudomonas savastanoi pv savastanoi</i> . Aplicar en BBCH 00-04, BBCH 11-69 y BBCH 80-85.
TOMATE	MILDIU	1,05 L/Ha	1-4	7-14 días	700 L/Ha	Eficaz contra <i>Phytophthora infestans</i> . Aplicar entre BBCH 15-89.
VID	MILDIU BACTERIOSIS	1,5 L/Ha	1-3	7-14 días	1000 L/Ha	Eficaz contra <i>Plasmopara viticola</i> . Aplicar entre BBCH 15-81.

Uso profesional: invernadero. Aplicación manual con lanza, pistola o mochila:

USO	AGENTE	DOSIS	NºAP	INT	CALDO	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
TOMATE	MILDIU	1,05 L/Ha	1-4	7-14 días	700 L/Ha	Eficaz contra <i>Phytophthora infestans</i> . Aplicar entre BBCH 15 hasta Desarrollo vegetativo inferior a 1 m.



USOS Y DOSIS AUTORIZADAS - NO AGRARIO

Uso NO profesional: En todos los usos: Aplicar con mochila pulverizadora de 5 L.

USO	AGENTE	DOSIS	NºAP	INT	CALDO	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
OLIVO	REPILO	1,5 L/Ha	1-2	23 días	1000 L/Ha	Eficaz contra <i>Cyloconium oleaginum</i> . Aplicar en BBCH 00-04, BBCH 11-69 y BBCH 80-85.
	TUBERCULOSIS	1,5 L/Ha	1-2	23 días	1000 L/Ha	Eficaz contra <i>Pseudomonas savastanoi pv savastanoi</i> . Aplicar en BBCH 00-04, BBCH 11-69 y BBCH 80-85.
TOMATE	MILDIU	1,05 L/Ha	1-4	7-14 días	700 L/Ha	Eficaz contra <i>Phytophthora infestans</i> . Aplicar entre BBCH 15-89.
VID	MILDIU BACTERIOSIS	1,5 L/Ha	1-3	7-14 días	1000 L/Ha	Eficaz contra <i>Plasmopara viticola</i> . Aplicar entre BBCH 15-81.

USOS Y DOSIS AUTORIZADAS OBSERVACIONES GENERALES

No superar la dosis máxima de 4 kg/ha y año de Cu [Cu inorgánico].
Observar precauciones por fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas.
En vid no aplicar durante la floración.

PLAZOS DE SEGURIDAD

Para **olivo** el plazo de seguridad será de 14 días.
Para **tomate** será de 3 días en tomate fresco y 10 días en tomate de industria.
Para **vid**, el plazo será de 21 días.



SOLEM
AGRICULTURA EN MOVIMIENTO



SÍGUENOS EN REDES COMO:
Agrosolem