



SOLEM
AGRICULTURA EN MOVIMIENTO



CORRECTORES



Para aplicación **foliar**.
Véanse recomendaciones de uso y dosificaciones.
Residuo cero según Reglamento UE 396/2005.

LÍQUIDO [LS]
SOLUBLE

GREEN BOR^R



**CONTENIDO
DECLARADO** %[p/p] // %[p/v]:
Boro (B) soluble en agua 11,00 15,00

B O R O E T A N O L A M I N A

- Alta concentración de Boro soluble** (15 % p/v) en forma de etanolamina, garantizando rápida absorción foliar.
- Movilidad superior del Boro:** transporte eficiente dentro del tejido vegetal.
- Previene y corrige deficiencias que afectan floración, cuajado y desarrollo del fruto.**
- Favorece la síntesis de azúcares y lignificación celular, mejorando la resistencia estructural.**
- Alta compatibilidad** con la mayoría de fertilizantes y fitosanitarios.
- Formulación estable, transparente y lista para mezclar, sin sedimentación.**



Envases 5 L
Cajas 4x5 L

fabricado por:
QUÍMICAS SOLEM SL



Polígono Industrial Polysol,
C. Polysol Dos, 13, C.P. 41500
Alcalá de Guadaira, Sevilla



954 10 17 26



info@agrosolem.com




www.agrosolem.com

+25

AÑOS EN
NUTRICIÓN
DE CULTIVOS

+info



GREEN BOR®

El boro es un micronutriente esencial para la fisiología vegetal, imprescindible para el crecimiento y desarrollo de las plantas, con funciones críticas en la estructura celular, el transporte de azúcares y la reproducción.

Aunque se requiere en cantidades muy pequeñas, su ausencia o deficiencia provoca graves alteraciones fisiológicas y morfológicas en los cultivos.

FUNCIONES FISIOLÓGICAS DEL BORO

Integridad de la pared celular:

El boro estabiliza la estructura de la pared celular al formar puentes entre las moléculas de pectina (ácido poligalacturónico), lo que confiere rigidez y resistencia mecánica.

Transporte de azúcares:


El boro facilita el transporte de azúcares desde las hojas hacia los órganos de reserva (raíces, frutos, semillas).

División y diferenciación celular:

El boro es esencial para la división celular y la formación de tejidos meristemáticos.

Reproducción y desarrollo reproductivo:

El boro es fundamental para la germinación del polen, el crecimiento del tubo polínico y la fertilización.



GREEN BOR® es un corrector líquido de Boro (B) formulado en etanolamina, que asegura una máxima estabilidad y rápida asimilación foliar. Su formulación en solución permite una distribución homogénea del micronutriente, favoreciendo la movilidad del Boro dentro de la planta.

GREEN BOR® está diseñado para prevenir y corregir las fisiopatías producidas por la carencia de este microelemento. Entre los principales síntomas carenciales podemos mencionar:

REMOLACHA: mal de corazón.

VID: Corrimiento del racimo, evitar frutos pequeños y arrugados.

OLIVO: Merma de la producción, secado de ramas (escobas de bruja), hojas de color tabaco y aceitunas deformadas.

ESPÁRRAGOS: Secado de punta y tallos.

PATATA: Necrosidades y deformaciones.

FRUTALES: Acorchado (bitter pit).

CORBO® corrige de forma rápida y eficaz los síntomas carenciales mejorando la producción, calidad y uniformidad del fruto.

En olivar, su aplicación al inicio de la floración y durante el cuajado aumenta el rendimiento graso y la sanidad del fruto.



MODO DE EMPLEO

Aplicación foliar.

Mojar abundantemente las hojas, evitando el goteo. Tratar a partir de una superficie foliar suficiente, repitiendo según necesidades y resultados.

SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA

- ⚠ Muerte de ápices meristemáticos.
- ⚠ Hojas deformadas, clorosis y necrosis.
- ⚠ Caída prematura de flores y frutos.
- ⚠ Raíces cortas y engrosadas.
- ⚠ Deformidades en los frutos.



DOSIFICACIÓN

Carencia débil 100-200 cc, por 100l de agua
Carencia moderada 300-400 cc./100l de agua.

Carencia fuerte 500-600 cc/100l. de agua.
Cultivos extensivos (girasol, remolacha, algodón, etc); se aplicarán 4-6 l./Ha.
En Viña, la dosis general es de 1-1,5 l./Ha.