

FOXAN[®]

FUNGICIDA SISTÉMICO INDUCTOR DE DEFENSAS

FOXAN[®] es un fungicida formulado en base a Fosfonato potásico 51% p/v [SL] especialmente eficaz frente a hongos como *Phytophthora* spp. (gomosis, podredumbre de cuello y raíces, y aguado de los cítricos; mildiu de las hortalizas: patata, pimiento, tomate y mildiu de la vid); *Alternaria* del caqui, *Bremia* spp. (mildiu de la lechuga y similares), *Venturia* spp. (Repilo del olivo y moteado o roña de los frutales).



Concentrado Soluble [SL]

FOSFONATO POTÁSICO

(EXPRESADO COMO ÁCIDO FOSFOROSO): 51% P/V (510 G/L).
EQUIVALENTE A 790 G/L DE MEZCLA DE FOSFONATOS POTÁSICOS.

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el N°: ES-00302
Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según HRAC:

GRUPO

P07

FUNGICIDA

VENTAJAS DE SU APLICACIÓN

Muy eficaz frente a hongos patógenos.

Uso autorizado **en los principales cultivos**.

Activa las defensas naturales de las plantas.


Bajo riesgo de resistencias por parte de los hongos.

Protege toda la planta incluso las nuevas brotaciones.

Seguro para el aplicador, el medioambiente y el consumidor.



FOXAN[®] además es **SISTÉMICO TOTAL** con capacidad de traslocación ascendente por el xilema y descendente por el floema **actuando de forma preventiva y curativa**. Actúa desde dentro protegiendo toda la planta incluso las brotaciones nuevas que aparecen tras la aplicación.



FOXAN® ejerce su acción a través de **dos vías distintas:**

Vía directa: sobre el patógeno impidiendo su desarrollo. **FOXAN®** presenta una acción directa sobre los hongos patógenos impidiendo la formación de esporas reproductoras.

Vía indirecta: activando las defensas de las plantas **FOXAN®** estimula la producción de sustancias de defensa naturales de las plantas (fitoalexinas). Las plantas tratadas reaccionan mejor y más rápido frente al ataque de hongos.

El FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) clasifica a **FOXAN®** con el código **MoA FRAC P07** que corresponde a fungicidas que actúan estimulando las defensas naturales de las plantas siendo inductores de defensa de la planta [SAR - Resistencia Sistémica Adquirida].

Las aplicaciones preventivas, antes que se instale la enfermedad, refuerzan las defensas de las plantas haciéndolas más fuertes frente al ataque de los hongos. Una vez que las esporas de la enfermedad germinan e intentan establecerse entran en contacto con **FOXAN®** y se inhibe el crecimiento del micelio, anulando al patógeno antes de que pueda establecerse.

FOXAN® refuerza y aumenta el poder fungicida de otros formulados cuando se aplica en mezclas, favoreciendo su efecto sinérgico inmediato.

FOXAN®

ACTÚA DESDE EL MOMENTO DE LA APLICACIÓN.



USOS Y DOSIS AUTORIZADAS

AGUACATE contra *Phytophthora cinnamomi*. Aplicar a la dosis de 0,75 a 3,75 l/ha con un volumen de caldo de 500-1500 l/ha. Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 10 días. Con dosis de 3,75 l/ha realizar una única aplicación. Aplicar al aire libre durante BBCH 59-67, 71-75, 75-85.

ARBUSTOS FRUTALES contra *Phytophthora spp.* Aplicar a la dosis de 0,45 a 2,5 l/ha con un volumen de caldo de 300-1000 l/ha. Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 15 días. Con dosis de 2,5 l/ha realizar una única aplicación. Indicado para MIRTILLO, GROSELLERO, ZARZAMORA Y FRAMBUESO. Aplicar al aire libre durante BBCH 33-69.

BERENJENA Y TOMATE contra Mildiu de la patata y el tomate (*Phytophthora infestans*) y **PIMIENTO** contra Mildiu del pimiento (*Phytophthora capsici*). Aplicar a la dosis de 0,45 a 2,5 l/ha con un volumen de caldo de 300-1000 l/ha. Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 10 días. Aplicar en invernadero durante BBCH 12-89.

CAQUI contra *Alternaria alternata*. Aplicar a la dosis de 0,45 a 2,5 l/ha con un volumen de caldo de 300-1000 l/ha. Realizar 2 - 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 15 días. Con dosis de 2,5 l/ha, realizar un máximo de dos aplicaciones. Aplicar al aire libre durante BBCH 76-89.

FRESAL contra *Phytophthora spp.* Aplicar a la dosis de 0,45 a 2,5 l/ha con un volumen de caldo de 300-1000 l/ha. Realizar máximo 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 10 días. Aplicar en invernadero durante BBCH 12-85.

HIERBAS AROMÁTICAS Y FLORES COMESTIBLES contra Mildiu de la lechuga (*Bremia lactucae*). Aplicar a la dosis de 0,45 a 2,5 l/ha con un volumen de caldo de 300-1000 l/ha. Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 10 días. Indicado para PERIFOLLO, CEBOLLINO, PEREJIL, SALVIA, ROMERO, TOMILLO, ALBAHACA Y ESTRAGÓN. Aplicar al aire libre durante BBCH 12-49.

LECHUGA Y SIMILARES contra Mildiu de la lechuga (*Bremia lactucae*). Aplicar a la dosis de 0,45 a 2,5 l/ha con un volumen de caldo de 300-1000 l/ha. Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 10 días. Aplicar al aire libre durante BBCH 12-49.

MANZANO, MEMBRILLERO, NISPERO, NISPERO DEL JAPÓN, NISPERO, NISPERO EUROPEO contra Moteado o roña del manzano (*Venturia inaequalis*) y Moteado o roña del peral (*Venturia pyrina*). Aplicar a la dosis de 0,75 a 2,5 l/ha con un volumen de caldo de 500-1000 l/ha. Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 5 días. Aplicar al aire libre durante BBCH 69-81.

NARANJO contra *Phytophthora spp.* Aplicar a la dosis de 1,5 a 8,75 l/ha con un volumen de caldo de 1000-3500 l/ha. Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 20 días. Aplicar al aire libre a partir del fin del desarrollo de los brotes (BBCH > 40), es decir, en primavera a partir del desarrollo total de los brotes.

LIMA (uso menor por jerarquía nacional de cultivos), **LIMONERO** y **MANDARINO** (incluido clementino e híbridos) contra *Phytophthora spp.* Aplicar a la dosis de 1,5 - 8,75 l/ha con un volumen de caldo de 1000 - 3500 l/ha. Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 20 días. Aplicar durante BBCH>40-59 y BBCH>69, evitando la floración del cultivo.

OLIVO contra Repilo del olivo (*Venturia oleaginea, Spilocaea oleaginea*). Aplicar a la dosis de 1,2 a 2,5 l/ha con un volumen de caldo de 800-1000 l/ha. Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 10 días. Con dosis de 2,5 l/ha realizar una única aplicación. Aplicar al aire libre durante BBCH 11-81.

PATATA contra Mildiu de la patata y el tomate (*Phytophthora infestans*). Aplicar a la dosis de 0,45 a 2,5 l/ha con un volumen de caldo de 300-1000 l/ha. Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 10 días. Aplicar al aire libre durante BBCH 12-49.

PERAL contra Moteado o roña del manzano (*Venturia inaequalis*) y Moteado o roña del peral (*Venturia pyrina*). Aplicar a la dosis de 0,75 a 2,5 l/ha con un volumen de caldo de 500-1000 l/ha. Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 5 - 7 días. Aplicar al aire libre durante BBCH 69-81.

PIÑA TROPICAL contra *Phytophthora nicotianae* y *Phytophthora cinnamomi*. Aplicar a la dosis de 4,5 a 6 l/ha con un volumen de caldo de 3000-4000 l/ha. Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 20 días. Aplicar al aire libre durante BBCH 10-79.

TORONJA Y POMELO contra *Phytophthora spp.* Aplicar a la dosis de 1,5 a 8,75 l/ha con un volumen de caldo de 1000-3500 l/ha. Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 20 días. Aplicar al aire libre a partir del fin del desarrollo de los brotes (BBCH > 40)

VID DE MESA Y VID DE VINIFICACIÓN contra Mildiu de la vid (*Plasmopara viticola*). Aplicar a la dosis de 0,75 a 2,5 l/ha con un volumen de caldo de 500-1000 l/ha. Realizar un máximo de 3 aplicaciones con intervalos mínimos de 10 días. Aplicar a partir del fin del desarrollo de las hojas (BBCH > 20), es decir, en primavera a partir del final del desarrollo de las hojas y aparición de las inflorescencias.

USOS MENORES AUTORIZADOS POR PROCEDIMIENTO NACIONAL

AGUACATE contra *Peronosporaceae*. Aplicar a la dosis de 0,75 a 2,5 l/ha con un volumen de caldo de 500-1000 l/ha. Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 10 días. Aplicar al aire libre a partir del fin del desarrollo de las hojas (BBCH > 20).T

SÍGUENOS EN REDES COMO:
Agrosolem

