


LEGON®



FLUROXIPIR 20% P/V (200 G/L)

(COMO 1-METIL HEPTIL ESTER)

Inscrito en el R.O.P.F. con el N°: ES-01188

HERBICIDA SELECTIVO

Para el control de malas hierbas anuales y perennes de hoja ancha más difíciles.

[EW]

Emulsión
de aceite
en agua



Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según HRAC:

GRUPO	0	HERBICIDA
-------	---	-----------



Líquido de color blanco.

* Densidad a 20°C.

* pH al 1%

Para aplicación foliar. Véanse recomendaciones de uso y dosificaciones.

**PARA USO
PROFESIONAL
AGRÍCOLA**

Autorizado para parques
y jardines según las
especificaciones recogidas
en el Real Decreto
1311/2012
de 14 de
septiembre.



Envases 1 L
Cajas 12x1 L
Envases 5 L
Cajas 4x5 L



CONYZA SP



ABUTILON



GALLIUM



PORTULACA



MALVA



RUMEX

MALAS HIERBA QUE CONTROLA

Conyza sp, Malva sylvestris, Portulaca oleracea, Abutilón theophrasti, Galium aparine, Convolvulus sp, Parietaria sp, Erodium sp, Stellaria sp, Polygonum aviculare, Rumex, Urtica sp, Xanthium sp, Rubus sp,...



954 10 17 26



info@agrosolem.com



www.agrosolem.com



LEGON® es un herbicida sistémico selectivo muy eficaz para combatir las malas hierba de hoja ancha de difícil control como: Conyza, Malva, Verdolaga (Portulaca), Lapa (Galium), Corregüela (Convolvulus), Abutilón,... en los cultivos de Olivo, Cítricos, Frutales de pepita, Maíz, Cebolla, Cereales y Céspedes. Así como en los cultivos definidos como usos menores.

LEGON® se absorbe principalmente por las hojas, y gracias a su sistemía se trasloca por toda la planta llegando a los órganos subterráneos evitando la aparición de rebrotes.

Con la mezcla con otros herbicidas de contacto (Glifosato, MCPA,...) se obtiene un control total y la combinación de distintos modos de acción disminuye el desarrollo de resistencias. (HRAC Group O).

NUEVA FORMULACIÓN

LEGON® presenta una novedosa formulación de emulsión de aceite en agua que mejora la eficacia del herbicida y es más respetuosa con el medio ambiente.

Uno de los herbicidas más seguros del mercado.

CONDICIONES GENERALES DE USO

- Tratamientos **herbicidas selectivos** en cultivos extensivos para el **control de malas hierbas anuales y perennes de hoja ancha**.
- Aplicación mediante **pulverización al suelo en post-emergencia en un único tratamiento** y con un volumen de caldo de 200-400 l/ha.
- La eficacia puede reducirse con temperaturas frías (menos de 10°C) o condiciones secas.
- En el cultivo de cebolla pueden apreciarse amarilleos, necrosis o enrollamiento en las hojas. Estos síntomas suelen aparecer especialmente si concurren diferencias significativas de temperatura poco después de la aplicación en cebolla en el estado de crecimiento de "4 hojas". Estos síntomas suelen ser generalmente transitorios y no afectan ni al rendimiento ni a la calidad.

IMPORTANTE

Seguir el orden de introducción en la cuba de aplicación, introduciendo **LEGON®** antes que las emulsiones concentradas (EC) y los líquidos solubles (LS) como Glifosato y MCPA.

USOS Y DOSIS AUTORIZADOS

Cultivo	Dosis L/Ha	Momento de aplicación	PLAZO DE SEGURIDAD
CEBOLLA	1	Aplicar durante BBCH 12-14	No procede
CEREALES DE INVIERNO Y PRIMAVERA	1	BBCH 12-39	No procede
CÉSOEDES	1	BBCH 20-25	No procede
CÍTRICOS	1,5	Primavera - otoño	15 días
FRUTALES DE PEPITA	1,5	Primavera - otoño	15 días
MAÍZ	1	BBCH 12-16	No procede
OLIVO (Después de la cosecha)	1,5	Primavera - otoño	120 días

FORMA Y ÉPOCA DE UTILIZACIÓN

CEBOLLA: en una sola aplicación.

CEREALES: exclusivamente para siembras de invierno en una sola aplicación.

CÉSPEDES: exclusivamente en céspedes recreativos en una sola aplicación.

CÍTRICOS Y FRUTALES DE PEPITA: aplicación en bandas en una sola aplicación.

MAÍZ: aplicar en una sola aplicación.

OLIVO: aplicación en bandas. Aplicar en primavera-otoño después de la cosecha en una sola aplicación. Las aceitunas no deben recogerse del suelo.

USOS MENORES AUTORIZADOS

Cultivo	Dosis L/Ha	Momento de aplicación	PLAZO DE SEGURIDAD
AJO, PUERRO	1	Aplicar durante BBCH 12-14	No procede
AGUACATE, CAQUI	1,5	Primavera - otoño	15 días
ALBARICOQUERO, CEREZO, CIRUELO Y ENDRINO	1,5	Hasta BBCH 10-69	No procede
ALMENDRO, AVELLANO, CASTAÑO, NOGAL, PACANO, NUEZ DE PÉCAN Y PISTACHERO	1,5	Hasta BBCH 10-69	No procede

FORMA Y ÉPOCA DE UTILIZACIÓN USOS MENORES

AJO, PUERRO: aplicar en una sola aplicación.

AGUACATE Y CAQUI: aplicar en pulverización al suelo en bandas, en una única aplicación.

ALBARICOQUERO, CEREZO, CIRUELO Y ENDRINO: aplicar en pulverización al suelo en bandas, en una única aplicación antes de la formación del fruto, hasta el fin de la floración (BBCH: 10-69).

ALMENDRO, AVELLANO, CASTAÑO, NOGAL, PACANO, NUEZ DE PÉCAN Y PISTACHERO: aplicar en pulverización al suelo en bandas, en una única aplicación antes de la formación del fruto, hasta el fin de la floración (BBCH: 10-69).