

CAPTASOL 80 FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN:

Captan 80% p/p (800 g/kg)

REGISTRO: ES-01158

APLICACIONES AUTORIZADAS

Albaricoquero, Ciruelo, Cerezo, Fresal, Frutales de pepita, Melocotonero, Tomate.

CARACTERÍSTICAS

CAPTASOL 80 es un fungicida de amplio espectro, en forma de granulado dispersable en agua, con actividad preventiva y también para cicatrización de heridas por granizo. La sustancia activa que contiene, captan, pertenece al grupo de los inhibidores multisitio.

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según FRAC:

GRUPO	M 04	FUNGICIDA
-------	------	-----------

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVO	PLAGA/EFEECTO	DOSIS Kg/ha	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	PS (días)
Albaricoquero, Ciruelo	Abolladura, lepra del melocotonero, <i>Taphrina deformans</i> , Cilindrosporiosis, antracnosis del cerezo, <i>Blumeriella jaapii</i> , Chancro del almendro, <i>Diaporthe amygdali</i> , Cribado, perdigonado, <i>Wilsonomyces carpophilus</i> , Monilia, <i>Monilinia</i> spp. Moteado del melocotonero, <i>Venturia carpophila</i> Cicatrización heridas	2,7	Uso menor de acuerdo con la jerarquía nacional de cultivos. Dosis:0,15-0,25%. A partir de la floración BBCH 60 Efectuar una única aplicación con un volumen de caldo de 1080-1800 l/ha.	21
Cerezo	Abolladura, lepra del melocotonero, <i>Taphrina deformans</i> , Chancro del almendro, <i>Diaporthe amygdali</i> , Moteado del melocotonero, <i>Venturia carpophila</i> , Cilindrosporiosis, antracnosis del cerezo, <i>Blumeriella jaapii</i> , Monilia, <i>Monilinia</i> spp. Cicatrización heridas Cribado, perdigonado, <i>Wilsonomyces carpophilus</i>	2,25	Uso menor de acuerdo con la jerarquía nacional de cultivos. Dosis:0,15-0,25%. A partir de la floración BBCH 60 Efectuar una única aplicación con un volumen de caldo de 900-1500 l/ha.	21
Fresal	Antracnosis del fresón, <i>Colletotrichum acutatum</i> , <i>Botrytis</i> spp. Oídio de la fresa, <i>Podosphaera aphanis</i>	1,8	Al aire libre e invernadero. Dosis:0,15-0,25%. A partir del final del desarrollo de las hojas. Efectuar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 7 días y un volumen de caldo de 720-1200 l/ha.	14

Frutales de pepita	Lepra, antracnosis del manzano, <i>Neofabraea vagabunda</i> , Chancro de las pomáceas, <i>Diplodia seriata</i> , Monilia, <i>Monilinia</i> spp. Moteado o roña del manzano, <i>Venturia inaequalis</i> , Estemfilosis, mancha negra, <i>Stemphylium vesicarium</i> , Cicatrización heridas, Moteado o roña del peral, <i>Venturia pyrina</i>	2	Dosis:0,15-0,25%. A partir de la caída de los primeros pétalos. Efectuar una única aplicación con un volumen de caldo de 800-1333 l/ha.	28
Melocotonero	Abolladura, lepra del melocotonero, <i>Taphrina deformans</i> Cilindrosporiosis, antracnosis del cerezo, <i>Blumeriella jaapii</i> Chancro del almendro, <i>Diaporthe amygdali</i> Cribado, perdigonado, <i>Wilsonomyces carpophilus</i> Monilia, <i>Monilinia</i> spp. Moteado del melocotonero, <i>Venturia carpophila</i> Cicatrización heridas	2,7	Dosis:0,15-0,25%. Efectuar una única aplicación con un volumen de caldo de 1080-1800 l/ha. A partir de la floración BBCH 60	21
Tomate	Alternaria de las solanáceas, <i>Alternaria solani</i> , Antracnosis, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> , <i>Botrytis</i> spp. Mildiu de la patata y el tomate, <i>Phytophthora infestans</i>	2,25	Dosis:0,15-0,25%. A partir de la formación de brotes laterales BBCH 21. Efectuar un máximo de 4 aplicaciones con un intervalo mínimo de 7 días, con un volumen de caldo de 900-1500 l/ha.	21

PS: Plazo de seguridad

NP: No procede establecer plazo de seguridad

Tratamiento fungicida al aire libre e invernadero.

Aplicación por pulverización con tractor al aire libre y pulverización foliar manual en invernadero.

OBSERVACIONES:

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Los usos autorizados en invernadero o cultivo protegido para este producto han sido solicitados con anterioridad al 1 de junio de 2022, y por tanto no han sido evaluados de acuerdo con los nuevos criterios de evaluación de sistemas de cultivo, en consonancia con las conclusiones del Southern Member States Steering Committee (SMS SC) y los criterios de EFSA Journal 2014; 12(3): 3615.

ADVERTENCIAS: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización, pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.