

DOSHY 25 FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN:

Azoxistrobin 25% p/v (250 g/l) (22,69% p/p). Contiene 1,2-benzisotiazolin-3(2H)-ona, puede provocar una reacción alérgica.

REGISTRO: ES-00692

APLICACIONES AUTORIZADAS

Avena, cebada, centeno, triticale, colza, guisantes para grano, guisantes verdes, trigo.

CARACTERÍSTICAS

DOSHY 25 es un fungicida sistémico de amplio espectro a base de azoxistrobin, con actividad translaminar y acción preventiva y curativa, para su uso en cereales, guisantes y colza. Azoxistrobin es un fungicida del grupo de las estrobilurinas (Qol), que actúa inhibiendo la respiración mitocondrial en los hongos. Es un fuerte inhibidor de la germinación de esporas, impide el crecimiento micelar y muestra una notable actividad antiesporulante.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVO	PLAGA/EFFECTO	DOSIS (l/ha)	PLAZO SEGURIDAD (días)
Avena	Roya coronada	1	NP
Cebada	Helmintosporiosis, roya parda, rincosporiosis, mal de pie de cereales	1	NP
Centeno y triticale	Roya parda, rincosporiosis, mal del pie de cereales	1	NP
Colza	Alternaria, esclerotinia	1	21
Guisantes para grano	Antracnosis, <i>Botrytis cinerea</i> , mancha foliar	1	36
Guisantes verdes	Antracnosis, <i>Botrytis cinerea</i> , mancha foliar	1	14
Trigo	Septoria, roya amarilla, roya parda, cladosporiosis, alternaria, mal de pie de cereales	1	NP

NP: no procede

Aplicar en pulverización normal con tractor, con un volumen de caldo de 200-300 l/ha, procurando una buena cobertura del cultivo, bajo buenas condiciones de cultivo y con una humedad adecuada.

Se recomienda utilizar AZOSHY como tratamiento preventivo o en estadios tempranos del desarrollo de la enfermedad. En cereales, la duración de la acción es generalmente de 4 a 6 semanas durante el encañado y puede ser mayor cuando la aplicación se realiza a la aparición de la hoja bandera/emergencia de la espiga.

Realizar un máximo de dos tratamientos por campaña con un intervalo mínimo entre las aplicaciones de 14 días en avena, cebada, centeno, guisantes para grano y guisantes verdes, trigo y triticale, y 21 días en colza.

Momento de aplicación

- **Avena y Cebada:** Aplicar desde comienzo del encañado (BBCH 30) hasta fin del espigado (BBCH 59).
- **Colza:** Aplicar durante la floración (BBCH 60- 69).
- **Guisantes para grano y guisantes verdes:** Aplicar desde 7 hojas (con estípulas) desplegadas o 9º zarcillo desarrollado (en las variedades sin hojas) (BBCH 17) hasta que durante la formación del fruto el 20% de las vainas alcanza la longitud típica (BBCH 72).
- **Trigo, centeno y triticale:** Aplicar desde comienzo del encañado (BBCH 30) hasta fin de la floración (tallo principal) (BBCH 69).

OBSERVACIONES:

- Ciertas variedades de manzano son muy sensibles a AZOSHY. Como medida de precaución, no se debe aplicar AZOSHY cuando exista riesgo de deriva a cultivos de manzano cercanos. El equipo de aplicación utilizado para aplicar AZOSHY a otros cultivos no se debe utilizar para tratamientos en manzano.
- Con el fin de reducir el riesgo de resistencias, no realizar más de 2 aplicaciones en cereales con productos que contenga fungicidas QoI. En caso de ser necesarios tratamientos adicionales, se emplearán otros fungicidas autorizados con modo de acción diferente.
- Almacenamiento del producto: Proteger de las heladas.

ADVERTENCIAS: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.