

LINDA 33 FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN:

Pendimetalina 33% p/v (330 g/l)
Contiene nafta disolvente del petróleo, nº CAS 64742-94-5.

REGISTRO: ES-00063

APLICACIONES AUTORIZADAS

Achicoria (hojas), Endibia, Lechuga, Algodonero, Árboles y arbustos frutales (este uso se refiere exclusivamente a aplicaciones en viveros de frutales), Cítricos, Frutales de cáscara, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Granado, Higuera, Coliflor, Girasol, Garbanzo, Guisantes para grano, Guisantes verdes, Habas para grano, Judías para grano y judías verdes, Haba verde, Maíz, Patata, Pimiento, Soja, Tabaco, Vid y Zanahoria.

CARACTERÍSTICAS

LINDA 33 es un herbicida selectivo a base de pendimetalina para el control de malas hierbas anuales gramíneas y de hoja ancha en pre-emergencia. Su persistencia en el suelo es del orden de 3 meses.

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según HRAC:

GRUPO	3	HERBICIDA
--------------	----------	------------------

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Cultivo	Malas hierbas controladas	Dosis (l/ha)	Volumen caldo (l/ha)	Forma y época de aplicación	PS (días)
Achicoria (hojas), Endibia, Lechuga	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	3-4,8	200-400	Aplicar en preemergencia o pretrasplante.	75
Algodonero	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	4-6	250-800	Aplicar en preemergencia del cultivo.	NP
Árboles y arbustos frutales (este uso se refiere exclusivamente a aplicaciones en viveros de frutales)	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	4-6	250-800	Aplicar en pre o postrasplante de las estaquillas.	
Cítricos, frutales de cáscara, frutales de hueso, frutales de pepita, granado, higuera	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	4-5,5	250-800	Aplicar entre líneas, desde la recolección de la fruta hasta la fijación del fruto de la campaña siguiente.	
Coliflor	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	3-4,8	250-800	Aplicar en pretrasplante del cultivo.	

Polysol Dos, 13 - 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tel: 95 410 17 26 - pedidos@agrosolem.com

Girasol	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	3,6-6	200-800	Aplicar en preemergencia del cultivo. La dosis máxima en cultivos destinados a forraje será de 3 l/Ha.
Garbanzo, guisantes para grano, guisantes verdes, habas para grano	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	3,6-6	200-800	Aplicar en preemergencia del cultivo.
Judías para grano y judías verdes, haba verde	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	3,6-4,8	200-800	Aplicar en preemergencia del cultivo.
Maíz	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	3,6-4,8	200-800	Aplicar en preemergencia del cultivo. La dosis máxima en cultivos destinados a forraje será de 3 l/Ha.
Patata	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	3,6-4,8	250-800	Aplicar en preemergencia del cultivo.
Pimiento	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	4-4,8	250-800	Aplicar en preemergencia o pretrasplante del cultivo.
Soja	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	3-6	250-600	Aplicar en preemergencia del cultivo.
Tabaco	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	3,6-4,8	250-800	Aplicar pretrasplante del cultivo.
	Inhibición de brotes auxiliares en tabaco	4,5-7,5	300-500	Aplicar al aparecer las primeras flores a razón de 20 cc/planta.
Vid	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	4-6	250-800	Aplicar durante la parada invernal en estado de yema dormida.
Zanahoria	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	3-4,8	250-800	Aplicar en preemergencia del cultivo.

PS: Plazo de seguridad NP: No procede fijar plazo de seguridad

Aplicar en pulverización a baja presión dirigida al suelo, manualmente o mediante tractor equipado de cabina cerrada y barra hidráulica, con el suelo bien preparado y limpio de malas hierbas.

Realizar una única aplicación por campaña.

La dosis máxima en cultivos destinados a forraje será de 3 l/ha.

Entre las especies de malas hierbas sensibles se encuentran:

Gramíneas: *Alopecurus myosuroides*, *Digitaria sanguinalis*, *Echinochloa crus-galli*, *Setaria spp.*, *Panicum dichotomiflorum*.

Anuales de hoja ancha: *Amaranthus spp.*, *Atriplex spp.*, *Heliotropium europaeum*, *Capsella bursa pastoris*, *Chenopodium album*, *Euphorbia spp.*, *Fumaria spp.*, *Myosotis arvensis*, *Mercurialis annua*, *Papaver rhoeas*, *Portulaca oleracea*, *Polygonum spp.*, *Solanum nigrum*, *Thlaspi arvenses*, *Urtica urens*, *Veronica spp.*



Polysol Dos, 13 - 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tel: 95 410 17 26 - pedidos@agrosolem.com

OBSERVACIONES:

Evitar la deriva a plantas situadas fuera de la zona objetivo debido al riesgo de daños.
El preparado no se usará en combinación con otros productos.

RESISTENCIAS:

Para evitar la aparición de resistencias siga las recomendaciones de la etiqueta y vigile regularmente los campos para detectar cualquier síntoma de bajo control. Utilice herbicidas con diferente modo de acción.

ADVERTENCIAS: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización, pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.