

TEBUPLUS 25 EW FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN:

Tebuconazol 25% p/v (250 g/l) (24,2% p/p)
Contiene dodecylbenceno sulfonato cálcico (CAS 26264-06-2)

REGISTRO: 25.941

APLICACIONES AUTORIZADAS

Avena, cebada, centeno, trigo, triticale, espárrago, melocotonero (incluye nectarino).

CARACTERÍSTICAS

TEBUPLUS 25 EW es un fungicida sistémico del grupo de los DMI (subgrupo de triazoles), con acción preventiva, curativa y erradicante frente a un amplio espectro de hongos (Basidiomicetos, Ascomicetos, y Deuteromicetos). A nivel bioquímico actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol mediante inhibición de la desmetilación.

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según FRAC:

GRUPO	3	FUNGICIDA
--------------	----------	------------------

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVO	PLAGA/EFFECTO	DOSIS	PS (días)
Avena	Helmintosporiosis de la avena, <i>Pyrenophora avenae</i> Septorios de las espigas del trigo, <i>Parastagonospora nodorum</i> Septorios del trigo, <i>Zymoseptoria tritici</i>	1 l/ha	28
Cebada	Helmintosporiosis reticular de la cebada, <i>Pyrenophora teres</i> Septorios de las espigas del trigo, <i>Parastagonospora nodorum</i> Septorios del trigo, <i>Zymoseptoria tritici</i>	1 l/ha	28
Centeno, trigo, triticale	Helmintosporiosis del trigo, <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> Septorios de las espigas del trigo, <i>Parastagonospora nodorum</i>	1 l/ha	28

	Septorios del trigo, <i>Zymoseptoria tritici</i>		
Espárrago	Roya del espárrago, <i>Puccinia asparagi</i>	1 l/ha	NP
Melocotonero (incluye nectarino)	Monilia, Monilinia spp. Oídio del rosal, <i>Podosphaera pannosa</i>	50-75 ml/hl (0.6-1.1 l/ha)	7

PS: Plazo de seguridad

Aplicar en pulverización normal.

Avena, cebada, centeno, trigo y triticale: Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 30 (comienzo del encañado) a BBCH 60 (fin de la floración). Emplear un volumen de caldo de 200-400 l/ha.

Espárrago: Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña mediante pulverización normal con tractor o manual (lanza y/o mochila) en postcosecha. Emplear un volumen de caldo de 1000 l/ha.

Melocotonero y nectarino: Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 57 (sépalos abiertos); ápices de los pétalos visibles; flores simples con pétalos blancos o rosados) a BBCH 89 (madurez de consumo). Emplear un volumen de caldo de 1200-1500 l/ha. Dosis por aplicación: 0,6-1,1 l/ha.

OBSERVACIONES:

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

PRECAUCIONES:

Se recomienda alternar los tratamientos con otros fungicidas de distinta naturaleza, con el fin de evitar la aparición de resistencia.

ADVERTENCIAS: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.