



SOLEM
AGRICULTURA EN MOVIMIENTO

GRUPO 29 INSECTICIDA



TEKITO

FLONICAMID 50% [WG] P/P

Control selectivo de
pulgones en multitud
de cultivos



AMENAZA: Género Aphis spp. PULGONES

TEKITO

CONTROL SELECTIVO DE PULGONES

Insecticida Selectivo, Sistémico y Translaminar para el control selectivo de pulgones en numerosos cultivos. Modo de acción exclusivo, único representante del Grupo 29 de los insecticidas, al actuar como inhibidor de la alimentación por contacto e ingestión.

FLONICAMID 50% P/P

R.O.P.F: ES-01829

**GRÁNULOS
DISPERSABLES [WG]**

100 gr
200 gr
1 Kg
5 Kg



MODO DE ACCIÓN ÚNICO

Único representante del Grupo IRAC 29. (Piridincaroamidatos). Sin resistencias cruzadas. Ideal para Gestión Integrada de Plagas. ACTÚA POR CONTACTO E INGESTIÓN.



SISTÉMICO Y TRANSLAMINAR

Sistema ascendente - protege los brotes nuevos. Efecto translaminar - para alcanzar y erradicar a los pulgones ocultos en el envés de las hojas.



BLOQUEO ALIMENTARIO

Inhibidor directo de los procesos de alimentación de insectos picadores / chupadores. El insecto es incapaz de extraer savia.



ALTA SELECTIVIDAD

Excelente control de ninfas y adultos en más de 40 especies de pulgones, tolerado por fauna auxiliar y respetuoso con polinizadores.



+30 AÑOS EN PROTECCIÓN DE CULTIVOS

+info



Distribuido por:

QUÍMICAS SOLEM SL

Polígono Industrial Polysol,
C. Polysol Dos, 13, C.P. 41500
Alcalá de Guadaira, Sevilla

954 10 17 26

info@agrosolem.com

www.agrosolem.com

PULGÓN El Parásito Botánico Perfecto.

El manejo exitoso exige comprender esta plaga no como un simple insecto, sino como un **sistema de extracción y replicación** altamente eficiente.



HIPER COLONIZACIÓN DEL TEJIDO FOLIAR

Propiciada por su arquitectura morfológica, su **polimorfismo** (forma áptera y forma alada) y su **ciclo biológico acelerado**, alternando reproducción sexual y asexual (partenogénesis - permite la clonación masiva sin apareamiento)

DAÑOS DIRECTOS

Succión mecánica de savia. Provoca amarilleamiento, debilitamiento y retraso general en el crecimiento. Introduce saliva tóxica en el sistema vascular que altera el desarrollo celular, causando curvaturas severas en tallos y enrollamiento de las hojas.

DAÑOS INDIRECTOS

La excreción de melaza **favorece la colonización del hongo negrilla**, provocando bloqueo físico de la luz solar y dificultad severa para la fotosíntesis.
Transmisión de virus fitopatógenos.

MATRIZ DE VENTAJAS


¿Por qué elegir TEKITO?

ALTA SELECTIVIDAD

Excelente control de ninfas y adultos en **más de 40 especies de pulgones.**

RESISTENCIA AL LAVADO

Altamente resistente al lavado por lluvia una vez que el secado del producto se ha completado.



RESPECTO MEDIOAMBIENTAL

Tolerado por la fauna auxiliar y respetuoso con polinizadores (aplicando fuera del horario de vuelo).

GESTIÓN DE RESISTENCIAS

Grupo 29 IRAC. Sin resistencias cruzadas, imprescindible para programas de control sostenible.

LA CURVA DE EFICACIA **Acción inmediata, protección duradera.**



CULTIVOS AUTORIZADOS: Algodonero, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Arroz, Calabacín, Calabaza, Cerezo, Ciruelo, Cítricos, Coníferas, Frondosas, Manzano, Melocotonero, Melón, Ornamentales herbáceas, Palmáceas, Palmera datilera, Pepino, Peral, Sandía, Tomate. // **Modo de empleo y Dosis - Descargar Ficha Técnica en la web escaneando QR pág. 1.**

Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional

AIRE LIBRE - PULVERIZACIÓN NORMAL CON TRACTOR

Uso	Dosis kg/ha	Nº apli.	Intervalo	V. de caldo	Forma y Época de aplicación / Condiciones específicas
Algodonero	0,075	2	14 Días	200-800 l/ha	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Para uso industrial. Aplicar después de los primeros síntomas. Dosis: 5-14 g/Hl.
Arbustos y pequeños Árboles ornamentales	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Exclusivamente para uso ornamental. Aplicar después de los primeros síntomas.
Arroz	0,12 - 0,14	1	-	200-300 l/ha	Dosis: 12-14 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas. Eficaz frente a Schizaphis graminum. Aplicar desde BBCH 32 hasta 60 Días antes de la cosecha.
Calabaza	0,1	3	14 Días	1000 l/ha	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis: 10 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.
Cerezo	0,14	2	21 Días	1000 l/ha	Dosis: 12-14 g/Hl. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento CE 1107/2009. Ver condicionamiento general. Aplicar antes de la infestación y antes de la floración.
Ciruelo	0,14	2	21 Días	1000 l/ha	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis: 12-14 g/Hl. Aplicar antes de la infestación y antes de la floración.
Cítricos	0,1-0,15	1-2	14 Días	500-3000 l/ha	Dosis: 5 g/Hl. En plantaciones jóvenes realizar 1 aplicación por campaña a dosis 0,1 kg/ha y caldo 500-3000 l/ha. En plantaciones adultas realizar 2 aplicaciones por campaña a dosis 0,15 kg/ha y caldo 2000-3000 l/ha. Aplicar después de los primeros síntomas.
Coníferas	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Exclusivamente para uso ornamental. Aplicar después de los primeros síntomas.
Frondosas	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Exclusivamente para uso ornamental. Aplicar después de los primeros síntomas.
Manzano	0,14	2	21 Días	1000 l/ha	Dosis: 12-14 g/Hl. Aplicar antes de la infestación y antes de la floración.
Melocotonero	0,14	2	21 Días	1000 l/ha	Dosis: 12-14 g/Hl. Aplicar antes de la infestación y antes de la floración.
Melón	0,1	3	14 Días	1000 l/ha	Dosis: 10 g/Hl. Aplicar cuando la altura del cultivo sea menor a 1 m.
Palmera datilera	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Exclusivamente para uso ornamental, no apto para consumo humano. Aplicar después de los primeros síntomas.
Peral	0,14	2	21 Días	1000 l/ha	Dosis: 12-14 g/Hl. Aplicar antes de la infestación y antes de la floración.
Sandía	0,1	3	14 Días	1000 l/ha	Dosis: 10 g/Hl. Aplicar cuando la altura del cultivo sea menor a 1 m.
Tomate	0,12	3	14 Días	1000 l/ha	Dosis: 10-12 g/Hl. Aplicar antes de la infestación.

Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional

AIRE LIBRE - MANUAL CON LANZA O PISTOLA

Uso	Dosis kg/ha	Nº apli.	Intervalo	V. de caldo	Forma y Época de aplicación / Condiciones específicas
Arbustos y pequeños Árboles ornamentales	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.
Calabaza	0,1	3	14 Días	1000 l/ha	Dosis: 10 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.
Cerezo	0,14	2	21 Días	1000 l/ha	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis: 12-14 g/Hl. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento CE 1107/2009. Ver condicionamiento general. Aplicar antes de la infestación y antes de la floración.
Ciruelo	0,14	2	21 Días	1000 l/ha	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis: 12-14 g/Hl. Aplicar antes de la infestación y antes de la floración.
Cítricos	0,1-0,15	1-2	14 Días	500-3000 l/ha	Dosis: 5 g/Hl. En plantaciones jóvenes realizar 1 aplicación por campaña a dosis 0,1 kg/ha y caldo 500-3000 l/ha. En plantaciones adultas realizar 2 aplicaciones por campaña a dosis 0,15 kg/ha y caldo 2000-3000 l/ha. Aplicar después de los primeros síntomas.
Coníferas	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Exclusivamente para uso ornamental. Aplicar después de los primeros síntomas.
Frondosas	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Exclusivamente para uso ornamental. Aplicar después de los primeros síntomas.
Manzano	0,14	2	21 Días	1000 l/ha	Dosis: 12-14 g/Hl. Aplicar antes de la infestación y antes de la floración.
Melocotonero	0,14	2	21 Días	1000 l/ha	Dosis: 12-14 g/Hl. Aplicar antes de la infestación y antes de la floración.
Melón	0,1	3	14 Días	1000 l/ha	Dosis: 10 g/Hl. Aplicar cuando la altura del cultivo sea menor a 1 m.
Ornamentales herbáceas	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.
Palmáceas	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.
Palmera datilera	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Exclusivamente para uso ornamental, no apto para consumo humano. Aplicar después de los primeros síntomas.
Pepino	0,1	3	14 Días	1000 l/ha	Dosis: 10 g/Hl. Aplicar cuando la altura del cultivo sea menor a 1 m.
Sandía	0,1	3	14 Días	1000 l/ha	Dosis: 10 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.
Tomate	0,12	3	14 Días	1000 l/ha	Dosis: 10-12 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.

Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional

INVERNADERO - MANUAL CON LANZA O PISTOLA

Uso	Dosis kg/ha	Nº apli.	Intervalo	V. de caldo	Forma y Época de aplicación / Condiciones específicas
Arbustos y pequeños Árboles ornamentales	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.
Calabacín	0,1	3	14 Días	1000 l/ha	Dosis: 10 g/Hl. Aplicar cuando la altura del cultivo sea menor a 1 m.
Calabaza	0,1	3	14 Días	1000 l/ha	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis: 10 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.
Coníferas	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Exclusivamente para uso ornamental. Aplicar después de los primeros síntomas.
Frondosas	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Exclusivamente para uso ornamental. Aplicar después de los primeros síntomas.
Melón	0,1	3	14 Días	1000 l/ha	Dosis: 10 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.
Ornamentales herbáceas	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.
Palmáceas	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.
Palmera datilera	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Exclusivamente para uso ornamental, no apto para consumo humano. Aplicar después de los primeros síntomas.
Pepino	0,1	3	14 Días	1000 l/ha	Dosis: 10 g/Hl. Aplicar cuando la altura del cultivo sea menor a 1 m.
Sandía	0,1	3	14 Días	1000 l/ha	Dosis: 10 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.
Tomate	0,12	3	14 Días	1000 l/ha	Dosis: 10-12 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.

Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional

INVERNADERO - MANUAL CON MOCHILA

Uso	Dosis kg/ha	Nº apli.	Intervalo	V. de caldo	Forma y Época de aplicación / Condiciones específicas
Arbustos y pequeños Árboles ornamentales	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.
Calabacín	0,1	3	14 Días	1000 l/ha	Dosis: 10 g/Hl. Aplicar cuando la altura del cultivo sea menor a 1 m.
Calabaza	0,1	3	14 Días	1000 l/ha	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis: 10 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.
Coníferas	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Exclusivamente para uso ornamental. Aplicar después de los primeros síntomas.
Frondosas	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Exclusivamente para uso ornamental. Aplicar después de los primeros síntomas.
Melón	0,1	3	14 Días	1000 l/ha	Dosis: 10 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.
Ornamentales herbáceas	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.
Palmáceas	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.
Palmera datilera	0,1	1	-	1000 l/ha	Dosis: 5-14 g/Hl. Dosis en aplicaciones dirigidas al suelo: 5 g/Hl. Exclusivamente para uso ornamental, no apto para consumo humano. Aplicar después de los primeros síntomas.
Pepino	0,1	3	14 Días	1000 l/ha	Dosis: 10 g/Hl. Aplicar cuando la altura del cultivo sea menor a 1 m.
Sandía	0,1	3	14 Días	1000 l/ha	Dosis: 10 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.
Tomate	0,12	3	14 Días	1000 l/ha	Dosis: 10-12 g/Hl. Aplicar después de los primeros síntomas.

TEKITO®



PLAZOS DE SEGURIDAD

Uso	P.S. (días)
Calabaza, Melón, Sandía, Tomate	1
Cerezo, Melocotonero	14
Manzano, Peral	21
Algodonero	30
Ciruelo	35
Arroz, Cítricos	60
Calabacín, Pepino	7
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Coníferas, Frondosas, Ornamentales herbáceas, Palmáceas, Palmera datilera	NO PROCEDE

 **SOLEM**
www.agrosolem.com



SÍGUENOS EN REDES COMO:
Agrosolem

Leánse las etiquetas de los productos antes de su utilización. El contenido de los folletos comerciales es meramente informativo y en ningún caso sustituye las instrucciones y recomendaciones de las etiquetas. **Prevaleciendo el contenido de las etiquetas** ante cualquier posible duda o discrepancia frente a cualquier otra información de carácter comercial.